

ফাউন্ডিং/সোনালী জাতের মুরগি পালন সহায়িকা

সুবিধা: মুরগি পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। পরিবারের গ্রাহিগ অমিষের চাহিদা পূরণে মুরগির ডিম ও মাংস অত্যন্ত মূল্যবান। তাই খুল্ল আসকারে ২০-১০০ টি ফাউন্ডিং বা সোনালী জাতের মুরগি পালন করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে পাশাপাশি বাড়তি আয় করা সম্ভব। এই জাতের মুরগি সরকারী মুরগির খামার থেকে ভর্তুকী মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

জাত পরিচিতি :

(ক) ফাউন্ডিং: (পাকিস্তানি/মিশরী নামেও পরিচিত)

সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

- ডিম দেয়া মুরগির জাত হিসেবে বিবেচিত।
- দেশী মুরগির মত চড়ে খেতে অস্বস্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।
- গলা ও খাড় দিল্লভার সাদা রঙের পালাকে ও কাপো কাপো ছোপে সাদা শরীর ঢাকা।
- প্রায় বয়স্ক মোরগের ওজন ২-২.৫ কেজি এবং মুরগির ওজন ১.৪-১.৬ কেজি হয়ে থাকে।
- ১৯-২০ সপ্তাহ বয়সে প্রথম ডিম পাড়া শুরু করে এবং বছরে ডিম উৎপাদন ২০০-২৪০টি, ডিমের গুণ হালকা সাদা।

(খ) সোনালী মুরগি

সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

- ডিম ও মাংস উৎপাদনের উপযোগী এবং দেশী মুরগির মত রোগপ্রাণী সহিষ্ণু।
- মালতে বাদামী বা সোনালী রঙের শক্ত-সামর্থ্য মাকারী আকারের সেকের জাতের মুরগি।
- গ্রামীণ পরিবেশে উৎকৃষ্ট ও আবহ উত্তর পছন্দের সহজেই পালন উপযোগী।
- প্রায় বয়স্ক মোরগের ওজন ২-২.৫ কেজি এবং মুরগির ওজন ১-১.৫ কেজি।
- ২০-২১ সপ্তাহ বয়সে প্রথম ডিম পাড়া শুরু এবং বছরে গড়ে ডিম উৎপাদন ১৯০-২০০টি, ডিমের গুণ হালকা বাদামী।

মুরগি পালন পদ্ধতি :

- ক) প্রয়োজনীয় স্থান : প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.৫ বর্গফুট, বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য ১ বর্গফুট এবং ডিমপাড়া মুরগির জন্য ২ বর্গফুট।
- খ) প্রয়োজনীয় উপকরণ : প্রতি ১৫-২০ টি মুরগির জন্য ১টি খাবার পার ও ১টি পানির পার দিতে হবে।
- গ) এক দিনের বাচ্চা পালন (ক্রেডিং): একদিন বয়সের বাচ্চাদের জন্মের পর থেকে ৪/৫ সপ্তাহ পর্যন্ত ১০০/২০০ ওয়াটার বাথের মাধ্যমে অভ্যস্ত রাখা দিতে হয়। বিশেষ করে শীতের দিনে এটা খুবই প্রয়োজন।
- ঘ) খাদ্য পালন: অল্প জালায় বেশী মুরগি নিরাপদে পালন করতে হবে বাঁশ, কচি ও নেটের মাধ্যমে ৮-১০ হাজার টাকায় দিন তলা বিশিষ্ট খাদ্য তৈরি করা যায়। প্রায় ৪ ফুট/১০'৪" উচ্চতা ৬ ফুট একতরফ একটি খাদ্য ২০টি করে ৬০টি বাড়ন্ত মুরগি এবং ১২টি করে ৩৬টি ডিম পাড়া মুরগি সহজেই পালন করা যায়।
- ঙ) ঘরের মোকদ্দম পালন : ঘরের মোকদ্দম তুষ, কাঠের তক্তা ১-২ ইঞ্চি পুরুত্বের বিছিয়ে দিতে হবে। ২-৩ মাস পর পর পরিবর্তন করে দিতে হবে। ঘরের চতুর্ভুজ নেট দ্বারা আবৃত থাকবে।
- চ) মুক্ত পদ্ধতি/বৈদেশিক পালন : দেশী মুরগির মত দিনের বেলা বাহিরে ঘুরে বেড়ায় এবং রাত্রে ঘরে ফিরে আসে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা :

- ক) বাচ্চার রেশন (স্টার্টার) : ১ দিন থেকে ৮ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার খাদ্য।
- খ) বাড়ন্ত বাচ্চার রেশন (গ্ৰোয়ার) : ৯ সপ্তাহ থেকে ১৬ সপ্তাহ বয়সের বাড়ন্ত বাচ্চার খাদ্য।
- গ) সোয়ার (ডিম পাড়া মুরগির রেশন) : ১৭ সপ্তাহের উপর মুরগির খাদ্য।

বিভিন্ন বয়সের রেশনে খাদ্য উপকরণের অনুপাত :

খাদ্য উপকরণ সমূহ	স্টার্টার রেশন%	গ্ৰোয়ার রেশন%	সোয়ার রেশন	মন্তব্য
১। ভুট্টা কাণা/গম ভাঙ্গা	৫৫-৬৫	৪৮-৬৪	৪৮-৬৩	এই ভর্তুকী অনুসারে যে কেউ খাদ্য উপকরণ ক্রয় করে রেশন সংকলন করে নিতে পারেন অথবা বাজারে স্টার্টার, গ্ৰোয়ার, সোয়ার নামে বিক্রি ভাল কোম্পানির রেডি ফ্রিড কিনে বয়স অনুসারে মুরগিকে খাওয়ানো পারেন।
২। চাউলের তুড়া/ডিমছাতর	৫-১০	৫-৭	৩-৫	
৩। সার্বানি মিল	১৫-২৪	১৫-২২	১-২৪	
৪। প্রোটিন কনসেন্ট্রেট ৬০%	৫-৮	৪-৭	৪-৭	
৫। খাদ্য লবন	০.২৫-০.৫০	০.২৫-০.৫০	০.২৫-০.৫০	
৬। ভিটামিন ওয়াশ/লাইমস্টোন	১-২	২-৩	৪-১০	
৭। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.১৫-০.২৫	০.২৫-০.৩২	০.২৫-০.৩২	

Farmer Hope

বিভিন্ন বয়সে ফাউন্ডিং/সোনালী মুরগিকে খাদ্য ও পানি প্রদানের পরিমাণ:

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (গ্রাম)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/দিন/মুরগি)	সর্বমোট খাদ্য গ্রহণ	পানি গ্রহণ ১০০০ মুরগি/দিনিক
১	৫০	১০	৬০	১০০ লিটার
২	৯০	১৫	১৬৫	
৩	১৫০	২০	৩০৫	
৪	২৪০	২৮	৫০১	
৫	৩১০	৩৬	৭৫৩	
৬	৩৯০	৪০	১০৩০	১৩০ লিটার
৭	৪৮০	৪৩	১৩৪৪	
৮	৫৬৬	৪৫	১৬৫৯	
৯	৬৪৬	৪৮	১৯৯৫	
১০	৭২৪	৫০	২৩৪৫	
১১	৮০৬	৫২	২৭০৮	১৬০ লিটার
১২	৮৮১	৫৫	৩০৯৪	
১৪	১০২১	৫৯	৩৯০৬	
১৬	১১৪৩	৬৫	৪৭৯৫	
১৮	১২৫৭	৭০	৫৭৫৪	
২০	১৩৫৮	৮৪	৬৮৮১	২০০ লিটার
২১-২২	১৪২০-২০০০	৯০-১১৫	৮৮০০০	

মুরগী পালনে প্রয়োজনীয় ঔষধ সমূহ :

ক্র. নং	ঔষধের নাম	ব্যবহারের ক্ষেত্র ও সময়	ডোজ (পানির সাথে)	মন্তব্য
১	থুলাকোট	১ম দিন বয়সে	৫০ গ্রাম/১ লি.	সকল বাচ্চা ঔষধ মিশ্রিত পানি খাওয়ার ৩ ঘণ্টা পর খাদ্য (স্টার্টার) দিতে হবে।
২	মুরা গ্রাস ভেট	১ম দিন ও টিকা দেয়ার পর প্রতিবার	১ গ্রাম/১ লি.	
৩	জিঞ্জি এ ভেট+নিমোসিন ভেট	২য়, ৩য়, ৪র্থ দিন	১ গ্রাম/২ লি.	সকাল বেলায় পানিতে
৪	কিটামিন্স ড্রিপিং এস		১ গ্রাম/৫ লি.	বিকালের পানিতে
৫	কলি অফ ভেট	১৪, ১৫, ১৬ তম দিন	১ গ্রাম/১ লি.	সকাল বেলায় পানিতে
৬	শেরাকোট (কৃমিনাশক)	৪০-৪৫ দিন	১ গ্রাম/১ লি.	সকাল বেলায় পানিতে প্রতি ৪৫ দিন পর পর খাওয়াতে হবে।
৭	হেপাফিট ভেট	সিডার সুস্থ্য রাখতে এবং কৃমিনাশক খাওয়ানোর পর প্রতিবার	১ গ্রাম/১ লি.	সন্ধ্যাবে ৩ দিন, মাসে ২ বার
৮	জাইটল এমাইনোফেট ভেট	ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে, ভিটামিন, মিনারেল এর ঘাটতি ভরিয়ে দেয়ায়	১ গ্রাম/৪ লি.	সন্ধ্যাবে ৩ দিন, মাসে ২ বার
৯	সিপি ভেট	ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে, ডিমের খোসা নরম হলে, সৈনিক বৃদ্ধিতে	১ গ্রাম/১ লি.	সন্ধ্যাবে ৩ দিন, মাসে ২ বার
১০	কিটা-এভিই ভেট	ভিটামিন এ, ডি ও ই এর অভাবজনিত সমস্যা, প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে, উৎপাদন বৃদ্ধিতে	১ মিলি/১-২ লি.	সন্ধ্যাবে ৩ দিন, মাসে ১ বার
১১	ফিল ভেট	পালক পড়ে যাওয়া, সৈনিক বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন ও হ্যাচারিবিগিটি করে শোলে,	২ মিলি/১ লি.	সন্ধ্যাবে ৩ দিন, মাসে ১ বার

প্রয়োজনে: আঞ্চলিক মুরগী খামার, চট্টগ্রাম (০১৩২৪২৯০৯৯৭) সরকারী মুরগী প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, সিলেট (০১৩২৪২৯০৬৫৮), কুমিল্লা (০১৩২৪২৯০৮৪৩), সোণাখালী (০১৩২৪২৯০৯২৪), সীতাকুণ্ড (০১৩২৪২৯১০০১) রাধাবাটী (০১৩২৪২৯১০৮৫)

সৌজন্যে:  আঞ্চলিক মুরগী খামার, পাড়াভতলী, চট্টগ্রাম